

10/529897

PCT/JP03/12793

31.10.03

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 2 5 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 8 3 8 0 1
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 8 3 8 0 1]

出 願 人 花王株式会社
Applicant(s):




PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 3 年 1 2 月 8 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 1 0 1 2 3 1

【書類名】 特許願

【整理番号】 030216

【特記事項】 特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特許出願

【提出日】 平成15年 3月25日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01N 33/50

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会社研究所内

 【氏名】 矢吹 雅之

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会社研究所内

 【氏名】 長谷川 義博

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会社研究所内

 【氏名】 矢部 恵美

【特許出願人】

 【識別番号】 000000918

 【氏名又は名称】 花王株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100104499

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 岸本 達人

 【電話番号】 03-5524-2323

【選任した代理人】

 【識別番号】 100108800

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 星野 哲郎

 【電話番号】 03-5524-2323

【選任した代理人】

【識別番号】 100101203

【弁理士】

【氏名又は名称】 山下 昭彦

【電話番号】 03-5524-2323

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 131935

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0209535

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 体臭の簡易判定キット及び判定方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 人の汗由来 β -ヒドロキシカルボン酸と反応する呈色試薬を含む人の体臭判定キット。

【請求項 2】 前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数 12 以下の脂肪酸と反応する呈色試薬をさらに含む請求項 1 に記載の人の体臭判定キット。

【請求項 3】 前記試薬が、ヒドラジノ基又はジアゾメチル基を有する化合物を必須成分とする請求項 1 又は 2 に記載の判定キット。

【請求項 4】 前記試薬が、2-ニトロフェニルヒドラジン又は 9-アンスリルジアゾメタンである請求項 3 に記載の判定キット。

【請求項 5】 人の汗に含まれる β -ヒドロキシカルボン酸及び前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数 12 以下の脂肪酸の混合物を抽出する第 1 ステップと、

前記混合物に前記試薬を加えて発色させる第 2 ステップと、

前記第 2 ステップにおいて発色した色によって体臭のタイプ及び／又はその強さを判定する第 3 ステップとを含む、人の体臭を判定する方法。

【請求項 6】 人の汗に含まれる β -ヒドロキシカルボン酸及び前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数 12 以下の脂肪酸の混合物を抽出する第 1 ステップと、

前記混合物から β -ヒドロキシカルボン酸を分離する第 2 ステップと、

前記第 2 ステップにおいて分離された β -ヒドロキシカルボン酸に前記試薬を反応させて発色させる第 3 ステップと、

前記第 3 ステップにおいて発現された色によって体臭のタイプ及び／又はその強さを判定する第 4 ステップとを含む、人の体臭を判定する方法。

【請求項 7】 人の汗に含まれる β -ヒドロキシカルボン酸及び前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数 12 以下の脂肪酸の混合物を抽出する第 1 ステップと、

前記混合物を β -ヒドロキシカルボン酸と前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外

の炭素数 12 以下の脂肪酸とにそれぞれ分離する第 2 ステップと、

前記第 2 ステップにおいて分離された β -ヒドロキシカルボン酸に前記試薬を反応させて発色させる第 3 ステップと、

前記第 2 ステップにおいて分離された β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数 12 以下の脂肪酸に前記試薬を反応させて発色させる第 4 ステップと、

前記第 3 ステップ及び第 4 ステップにおいて発現された色によって体臭のタイプ及び／又はその強さを判定する第 5 ステップとを含む、人の体臭を判定する方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、人の汗由来 β -ヒドロキシカルボン酸等を呈色試薬と反応させ、発現された色によって体臭のタイプ（酸臭、アポクリン臭、混合臭）及び体臭の強さを簡単に判定することが可能な判定キット及び判定方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

体臭は全身の各部から発生するニオイの総称であり、主要な発生部位としては、頭部、口腔、腋窩部、足の裏等がある。その中でも腋臭は本人又はそばに居る人に感知されやすいため、その程度、例えば腋臭の有無、強さ、質的な相違等の諸要素が全身的な体臭の程度を支配することが多い。さらに体臭というよりは腋臭そのものが気にかかる場合も多い。

【0003】

人間の腋窩部には、ほぼ全身に分布するエクリン汗腺だけでなく、アポクリン汗腺と呼ばれる特殊な汗腺が存在している。また、この部位の汗は蒸発しにくく、細菌が増殖しやすい部位でもあるために、2つの汗腺から分泌された汗が皮膚上の細菌によって代謝されて、ニオイが発生しやすい。

【0004】

エクリン汗に由来するニオイは一般的に酸臭または汗臭と呼ばれ、腋の下だけでなく、全身の皮膚表面から発生している。一方、アポクリン汗腺に由来するニ

オイは、いわゆる、わきが体質と言われる人の腋窩部から発生し、アポクリン臭とか、単に“腋臭（わきが）”と呼ばれて区別されている。

【0005】

腋臭体質の人は、腋窩部のアポクリン汗腺の数が多い傾向があり、エクリン汗が原因で発生する汗臭とアポクリン臭が混じり合って、強くて独特なニオイを形成している。そこで、自己の腋臭が気になる場合には、制汗作用や殺菌作用のあるデオドラント剤を使用するか、アポクリン臭が極端に強い場合には、腋窩部のアポクリン汗腺を外科的に取り去ることで、ニオイを減ずる試みが行われる。

【0006】

たとえ自分では気がつかないレベルであっても、美容師や歯科医師のようにわきの部分が他人の顔面の近くにくるような職業に就いている人や、家庭や学校、会社などで他人に体臭を指摘されたことがある人は、自己の腋窩部にアポクリン臭が元々どの程度あるのか、さらにはデオドラント剤の使用やアポクリン汗腺の除去手術等の体臭を軽減する努力が現状において功を奏しているのかということが重要な関心事である。

【0007】

従来、体臭の判定方法としては、（１）ニオイを鼻で嗅いで判定する方法、（２）ニオイ成分をガスクロマトグラフィー等により分析する方法（３）アポクリン汗腺の数や大きさから推定する方法、（４）家族内にわきが体質の人がいるかどうかといった遺伝情報や、耳垢が湿っているかという、アポクリン臭との関連性が指摘されている事実から推定する方法がある。

【0008】

（１）の方法は、まず熟練した皮膚科医などの専門パネリストを必要とし、手軽に実施できない。またその方法は、被験者の腋のニオイを脱脂綿などで拭き取って嗅ぎ、アポクリン臭の程度を官能的に判定するものであるが、本方法は評価者の主観的判断が入る余地が大きく、定量的な判断が難しい。さらに連続的に評価する場合には、嗅覚の疲労により、客観性が低下する恐れがある。

【0009】

（２）の方法は、１つのサンプルを分析するために通例半日以上の間がかか

る。また分析機器の設置やメンテナンスには多額の費用が必要となるので、簡単に実施できる方法ではない。

【0010】

(3)の方法は、医師が腋窩部を外科的に切開してアポクリン汗腺の数や大きさを観察し、その様子から体臭の程度を推定する方法であるが、被験者にとって、精神的および肉体的苦痛が大きく、簡単に実施できる方法ではない。また一般に手術費用は高額である。

【0011】

(4)の方法は、ニオイそのものを判断しているわけではなく、間接的な判定方法であり、正確性に欠け、実用的ではない。

【0012】

従って、体臭、特にアポクリン臭の診断を、確実に迅速かつ簡便に行える判定キット、判定方法が望まれる。

【0013】

また、従来、アポクリン臭の特徴成分としては、trans-3-メチル-2-ヘキセン酸、7-オクテン酸に代表される炭素数6～10の不飽和カルボン酸が知られているが(非特許文献1)、人の腋窩部には、酸臭の原因となる炭素数5以下の低級カルボン酸や皮脂由来の高級カルボン酸も混在しており、これら多種多様のニオイ成分の中からアポクリン臭の特徴成分である前述の不飽和カルボン酸のみを選択的に分離することは困難であった。

【0014】

【特許文献1】

特開平10-25265号公報

【非特許文献1】

「味とにおいの分子認識」, 化学総説, 1999年, No.40, p.205-211

【0015】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、体臭のタイプ及びニオイの程度を確実に迅速かつ簡単に判定することが可能な体臭判定キット、及びそれを用いて体臭を判定する方法を提供

することにある。

【0016】

【課題を解決するための手段】

発明者らは、腋の下に汗に含まれるアポクリン臭の特徴成分について鋭意研究を行ったところ、アポクリン臭に極めて良く似ており、かつアポクリン臭のある人の汗に特異的に存在し、さらに、簡単な化学操作により単離可能な成分が汗の中に存在していることを発見した。

【0017】

すなわち、発明者らが腋の下に汗から検出・同定した3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸は以下のような特徴があることから、腋窩部における3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸の存在量と存在状態が、腋窩部のアポクリン臭の程度及び個体差を形成するものとなっている。

【0018】

(3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸の特徴)

(1) アポクリン臭を持っている人の腋窩部の汗からは、3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸が特異的に検出される。

(2) アポクリン臭が強いほど、腋窩部の汗に含まれる3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸の量が多い。

(3) アポクリン臭の認められない人の腋窩部の汗中からは、3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸はほとんど検出されない。

(4) また、3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸は、ヒドロキシル基を有するために、分子の極性が高く、吸着カラムクロマトグラフィーなどの方法により単離できるため、確実に迅速かつ簡単な呈色反応を利用して定量評価することができる。

【0019】

3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸は公知の化合物であり、特許文献1には動物系の合成香料素材として用い得ることが記載されているが、アポクリン臭の主要な原因成分であることは今まで報告されたことがなく、かかる事実本発明者らによって発見されたものである。

【0020】

そして本発明者らは、アポクリン臭の主要な原因物質として新たに見出された 3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸を含む β -ヒドロキシカルボン酸を腋窩部の汗から分離した後、呈色試薬と反応させて、発現された色によって、アポクリン臭の程度を簡単に判定できる点に着目し、アポクリン臭そのものの程度、又は、アポクリン臭を中心とした総合的な体臭の程度を確実に簡単に判定できるキット及び該キットを用いた体臭判定方法を開発した。

【0021】

本発明は、人の汗由来 β -ヒドロキシカルボン酸及び／又は前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数 12 以下の脂肪酸と反応する呈色試薬を含む人の体臭判定キットである。人間の汗由来の体臭の程度を、アポクリン臭の原因物質である β -ヒドロキシカルボン酸、及び、酸臭の原因物質である該 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数 12 以下の脂肪酸を呈色試薬と反応させることにより、発現された色によって、ニオイのタイプ及びニオイの強さを確実に迅速かつ簡単に判定することを可能にした。

【0022】

前記本発明のキットを用いる第一の体臭判定方法は、人の汗に含まれる β -ヒドロキシカルボン酸及び前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数 12 以下の脂肪酸の混合物を抽出する第 1 ステップと、

前記混合物に前記キットの試薬を加えて発色させる第 2 ステップと、

前記第 2 ステップにおいて発色した色によって体臭のタイプ及び／又はその強さを判定する第 3 ステップとを含む、人の体臭を判定する方法である。

【0023】

また、前記本発明のキットを用いる第二の体臭判定方法は、人の汗に含まれる β -ヒドロキシカルボン酸及び前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数 12 以下の脂肪酸の混合物を抽出する第 1 ステップと、

前記混合物から β -ヒドロキシカルボン酸を分離する第 2 ステップと、

前記第 2 ステップにおいて分離された β -ヒドロキシカルボン酸に前記試薬を反応させて発色させる第 3 ステップと、

前記第3ステップにおいて発現された色によって体臭のタイプ及び／又はその強さを判定する第4ステップとを含む、人の体臭を判定する方法。

【0024】

さらに、前記本発明のキットを用いる第三の体臭判定方法は、人の汗に含まれる β -ヒドロキシカルボン酸及び前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸の混合物を抽出する第1ステップと、

前記混合物を β -ヒドロキシカルボン酸と前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸とに、それぞれ分離する第2ステップと、

前記第2ステップにおいて分離された β -ヒドロキシカルボン酸に前記キットの試薬を反応させて発色させる第3ステップと、

前記第2ステップにおいて分離された β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸に前記キットの試薬を反応させて発色させる第4ステップと、

前記第3ステップ及び第4ステップにおいて発現された色によって体臭のタイプ及び／又はその強さを判定する第5ステップとを含む、人の体臭を判定する方法である。

【0025】

【発明の実施の形態】

本発明に係る体臭判定用キットは、少なくとも、人の汗由来の β -ヒドロキシカルボン酸と反応する呈色試薬と共に、該 β -ヒドロキシカルボン酸及び／又は汗由来のその他の体臭原因成分と該呈色試薬との反応及び呈色に基づく判定を補助する付属物が組み合わされた製品であり、補助のための付属物には、呈色反応又は判定に先立って必ず行われる前処理に用いる抽出手段など、必須のものと、呈色反応又は判定を容易化、簡易化するなど、利便性を高めるものがある。

体臭判定用キットは、例えば、腋窩部の汗から β -ヒドロキシカルボン酸及び／又は該 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸を抽出・分離するための器材および試薬を含み、かつ人の汗由来の β -ヒドロキシカルボン酸及び／又は β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸と反応して発色する試薬を一つ以上含んでいる。さらに、前記キットには3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸を指標成分として含むこともできる。

β -ヒドロキシカルボン酸及び該 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸の呈色反応を利用して、人の汗由来の体臭、特にアポクリン臭を判定する手順の概略を図1に示す。また体臭判定用キットに含まれる代表的な器材とその利用例を図2、図3に示す。

【0026】

腋窩部の汗を採取する方法としては、温熱発汗により流れ出た汗を直接試験管等に採取する方法、わきの下に当たる部分に綿製のパッドを縫い付けたTシャツを一定時間着用する、または、ガーゼ等でわきの下の汗を直接拭き取るなどの方法がある。

【0027】

汗に含まれる酸性物質を抽出する方法は、前記酸性物質を抽出できる方法であれば特に限定されないが、アルカリ性の水溶液による酸一塩基抽出法を用いるのが一般的である。アルカリ性の水溶液としては、炭酸水素ナトリウム水溶液、炭酸ナトリウム水溶液、水酸化ナトリウム水溶液、水酸化カリウム水溶液等が挙げられる。また、イオン交換樹脂を用いて前記酸性物質を抽出することも可能である。

【0028】

アポクリン臭の度合いを判定する方法としては、前記操作で抽出された酸性物質を β -ヒドロキシカルボン酸と前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸とに、それぞれ分離した後、分離された β -ヒドロキシカルボン酸に対して呈色試薬を加えて、発現された色を観察する方法が挙げられる。

【0029】

酸性物質中の β -ヒドロキシカルボン酸と該 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸を分離する方法は、分子の極性によって分離できる方法であれば、特に限定されるものではなく、ガラス管やプラスチック管内にシリカゲル粉末等の適当な吸着剤が充填された吸着クロマトグラフィー、ガラス又はプラスチックのプレート等にシリカゲル等の適当な吸着剤がコーティングされた薄層クロマトグラフィー等が利用できる。

【0030】

吸着カラムクロマトグラフィー法は、ガラス管の上から前記酸性物質の溶液を流下させると、吸着力の強いものは上部に止まり、弱いものほど先に流れるので、吸着力の弱いものから順次流し出して分取できる。人の汗由来の酸性物質をサンプルとする場合、例えば図2に示すが如く、はじめにジエチルエーテルのような中極性溶媒を用いて、 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸を含むカルボン酸類を溶出した後、メタノールのような高極性溶剤を使って β -ヒドロキシカルボン酸を分取することができる。従って、メタノール画分に発色試薬を加えて呈色すれば、人の汗由来の β -ヒドロキシカルボン酸の存在が確認できる。また試験液の色相は、目視による官能評価だけでなく、分光光度計や色差計の機器測定により数値化することができる。

【0031】

薄層クロマトグラフィー法は、極性に差がある分子をプレート上で分離する方法であり、例えば図3に示すが如く、人の汗由来の酸性物質をプレートの所定の位置に滴下した後、ジエチルエーテルのような中極性溶媒で展開すれば、 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸は溶媒とともに周りに広がっていくが、 β -ヒドロキシカルボン酸は滴下位置に残る。従って、滴下スポットの中心部に発色試薬を滴下して呈色すれば、汗由来の β -ヒドロキシカルボン酸の存在が確認できる。このように、薄層クロマトグラフィー法は、発色試薬を直接プレートに吹き付けることができるので、定性又は定量のための呈色試験が迅速に行える。

【0032】

呈色反応を利用して β -ヒドロキシカルボン酸の有無や存在量を判定する方法としては、(1) β -ヒドロキシカルボン酸のヒドロキシル基、またはカルボキシル基に直接発色団を導入する方法、(2) β -ヒドロキシカルボン酸を誘導体に変換した後、誘導体に発色団を導入する方法、(3) β -ヒドロキシカルボン酸を分解した後、分解物に発色団を導入する方法等が挙げられる。

【0033】

(1) β -ヒドロキシカルボン酸のヒドロキシル基、またはカルボキシル基に直接発色団を導入する方法に用いられる、 β -ヒドロキシカルボン酸のカルボキ

シル基と反応して発色する呈色試薬としては、 β -ヒドロキシカルボン酸を縮合剤の存在下、発色性の酸ヒドラジドに導いて呈色させる試薬、 β -ヒドロキシカルボン酸を発色性のエステルに導いて呈色させる試薬、 β -ヒドロキシカルボン酸を発色性のアミドに導いて呈色させる試薬等がある。

【0034】

発色性の酸ヒドラジドに導く呈色試薬としては、2-ニトロフェニルヒドラジン、6, 7-ジメトキシ-1-メチル-2 (1H)-キノキサリノン-3-プロピオニルカルボン酸ヒドラジド (DMEQ-H)、p-(4, 5-ジフェニル-1H-イミダゾール-2-イル)-ベンゾヒドラジド、p-(1-メチル-1H-フェナントロ-[9, 10-d]イミダゾール-2-イル)-ベンゾヒドラジド、p-(5, 6-ジメトキシ-2-ベンゾチアゾイル)-ベンゾヒドラジド等が挙げられる。

【0035】

発色性のエステルに導いて呈色させる試薬としては、9-アンスリルジアゾメタン、1-ナフチルジアゾメタン、1-(2-ナフチル)ジアゾエタン、1-ピレニルジアゾメタン、4-ジアゾメチル-7-メトキシクマリン、4-ブロモメチル-7-メトキシクマリン、3-ブロモメチル-6, 7-ジメトキシ-1-メチル-2 (1H)-キノキサリノン、9-ブロモメチルアクリジン、4-ブロモメチル-6, 7-メチレンジオキシクマリン、N-(9-アクリジニル)-ブロモアセトアミド、2-(2, 3-ナフチルイミノ)エチルトリフルオロメタンスルホネート、2-(フタルイミノ)エチルトリフルオロメタンスルホネート、N-クロロメチルフタルイミド、N-クロロメチル-4-ニトロフタルイミド、N-クロロメチルイサチン、o-(p-ニトロベンジル)-N, N'-ジイソプロピルイソウレア等が挙げられる。

【0036】

発色性のアミドに導いて呈色させる試薬としては、モノダンシルカダベリン、2-(p-アミノメチルフェニル)-N, N-ジメチル-2H-ベンゾトリアゾール-5-アミン等が挙げられる。

【0037】

β -ヒドロキシカルボン酸のヒドロキシル基と反応して発色する呈色試薬としては、発色性の配位化合物に導いて呈色させる試薬、発色性のエステルに導いて呈色させる試薬、発色性のエーテルに導いて呈色させる試薬等がある。発色性の配位化合物に導いて呈色させる試薬としては、硝酸セリウムアンモニウム等が挙げられる。発色性のエステルに導いて呈色させる試薬としては、4-(2-フルイミジル)ベンゾイルクロライド、その異性体およびこの誘導体等が挙げられる。発色性のエーテルに導いて呈色させる試薬としては、4-ジアゾメチルー7-メトキシクマリン等が挙げられる。

【0038】

(2) β -ヒドロキシカルボン酸を誘導体に変換した後、誘導体に発色団を導入する方法において、呈色反応に利用できる β -ヒドロキシカルボン酸の誘導体としては、無機塩、ヒドロキサム酸、酸クロライド、銅錯体やコバルト錯体等が挙げられる。

β -ヒドロキシカルボン酸の無機塩は芳香族ハロゲンと反応させて発色性のエステルに、ヒドロキサム酸は発色性の金属塩に、酸クロライドは発色性のアミドに、ヒドロキシカルボン酸の銅錯体やコバルト錯体は、銅やコバルトに反応して呈色するキレート化合物に、それぞれ誘導する。

【0039】

β -ヒドロキシカルボン酸を無機塩に変換する方法としては、炭酸水素ナトリウム溶液、炭酸ナトリウム溶液、水酸化ナトリウム溶液、水酸化カリウム溶液等のアルカリ性物質と混合して中和する方法が挙げられる。ヒドロキシカルボン酸の無機塩と反応し、発色性のエステルに誘導できる芳香族ハロゲンとしては、p-ニトロベンジルブロミド、フェナシルブロミド、p-クロロフェナシルブロミド、p-ブロモフェナシルブロミド、p-ヨードフェナシルブロミド、p-ニトロフェナシルブロミド、p-フェニルフェナシルブロミド、p-フェニルアゾフェナシルブロミド、N,N-ジメチルー p-アミノベンゼンアゾフェナシルクロライド等が挙げられる。

【0040】

β -ヒドロキシカルボン酸をヒドロキサム酸へ変換する方法としては、縮合剤

の存在下、ヒドロキシルアミンと反応させる方法、ニッケルを触媒として、塩酸ヒドロキシルアミンと反応させる方法等が挙げられる。ヒドロキサム酸と発色性の錯塩を形成する金属試薬としては、塩化第二鉄、バナジウム等が挙げられる。

【0041】

β -ヒドロキシカルボン酸を酸クロライドに変換する方法としては、オキサリルクロライドと反応させる方法等が挙げられる。酸クロライドを発色性のアミドに導く方法としては、トリエチルアミンの存在下、9-アミノフェナントレンと反応させる方法等が挙げられる。

【0042】

銅またはコバルトと発色性のキレート化合物(錯体)を形成する試薬としては、ジエチルジチオカルバミン酸、ビスクロヘキサノンオキサリルジヒドラゾン、バソクプロイン等が挙げられる。

【0043】

(3) β -ヒドロキシカルボン酸を分解し、その分解物に対して発色させる方法としては、 β -ヒドロキシカルボン酸にアデノシン三リン酸(ATP)と補酵素C o Aの存在のもとで、アシル-C o Aシンテターゼを作用させて、アシル-C o Aを生成せしめ、次にアシル-C o Aオキシダーゼで処理して、エノイル-C o Aと過酸化水素を生成せしめ、さらに過酸化水素をカタラーゼで処理してホルムアルデヒドにし、これに呈色試薬である4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1, 2, 3-トリアゾール(AHMT)を反応させて、生じる紫色を比色する方法が挙げられる。

【0044】

このように、本発明において、 β -ヒドロキシカルボン酸の呈色反応に用いられる試薬は β -ヒドロキシカルボン酸、 β -ヒドロキシカルボン酸誘導体、 β -ヒドロキシカルボン酸分解物のいずれかと反応して発色するものであれば特に限定されないが、人の汗由来の β -ヒドロキシカルボン酸に対する検出感度が高く、かつ肉眼で容易に比色できる2-ニトロフェニルヒドラジン(2-NPH)等のヒドラジノ基を有する化合物、また、検出感度が高く、温和な条件で反応が進行する9-アンスリルジアゾメタン(ADAM)等のジアゾメチル基を有する化合物が

好適である。


【0045】

2-ニトロフェニルヒドラジンを用いた呈色反応とは、水またはアルコール溶液中、縮合剤の存在下、 β -ヒドロキシカルボン酸に2-ニトロフェニルヒドラジンを反応させ、アルカリ条件下で赤紫色を呈する酸ヒドラジドを生成せしめる反応である（反応式（1））。

【0046】

【化1】

反応式（1）



【0047】

縮合剤としては、ジシクロヘキシルカルボジイミド（DCC）または1-エチル-3-（3-ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド（EDC）などが利用できる。またアルカリ化剤としては、水酸化カリウム水溶液等が利用できる。

【0048】

3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸0.01～0.05 μM を含む水またはアルコール溶液0.5 mLに2-ニトロフェニルヒドラジン塩酸塩0.02 Mを含む水またはアルコール溶液0.5 mLを加えた場合、試験液はやや茶色がかった黄色を呈する。また、3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸0.05～1 μM を含む水溶液またはアルコール溶液0.5 mLに対して、2-ニトロフェニルヒドラジン0.02 Mを含む水またはアルコール溶液0.5 mLを加えた場合、試験液は赤茶色から濃い赤紫色に発色する。これに対して、ヒドロキシカルボン酸を全く含まない水またはアルコール溶液に対して、2-ニトロフェニルヒドラジンを含む水またはアルコール溶液を添加しても、酸ヒドラジドは生成しない。

ため、試験液の色は未反応の 2-ニトロフェニルヒドラジン由来の黄色のまま変化しない。

【0049】

前述の如く、アポクリン臭の強さは、汗中の β -ヒドロキシカルボン酸の含有量に比例するので、試験液の発色の度合いを肉眼で観察することで、アポクリン臭の程度を確実に迅速かつ簡単に判定することができる。


【0050】

9-アンスリルジアゾメタンを用いた呈色反応とは、 β -ヒドロキシカルボン酸を強蛍光性の 9-アンスリルメチルエステルに導く方法である（反応式（2））。

【0051】

【化2】

反応式（2）



【0052】

本反応は、触媒や加熱を必要とせず、室温、約 10～60 分で完了する。9-アンスリルメチルエステルは、メタノール中では、励起波長 365 nm、蛍光波長 412 nm の特性を持っている。

【0053】

3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサノ酸 0.01～0.05 μ M を含むメタノール溶液に 9-アンスリルジアゾメタンの 1.0% メタノール又はアセトン溶液を添加した後、365 nm の光で照らすと、やや青色がかった白色を呈し、さら

に 3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸 0.05~0.1 μ M を含むメタノール溶液に 9-アンスリルジアゾメタンの 1.0% メタノール又はアセトン溶液を添加した後、365 nm の光で照らすと、試験液は強い青色の蛍光を放つ。一方、 β -ヒドロキシカルボン酸を全く含まない溶液に対して、9-アンスリルジアゾメタンの 1.0% メタノールアルコール溶液を添加しても、強蛍光性のエステル体は生成しない。

【0054】

前述の如く、アポクリン臭の強さは、汗中の β -ヒドロキシカルボン酸の含有量に比例するので、試験液の発色の度合いを肉眼で観察することで、アポクリン臭の程度を確実に迅速かつ簡単に判定することができる。

【0055】

本発明においては、汗に含まれる β -ヒドロキシカルボン酸を腋窩部の汗から単離した後、呈色試薬により定量評価する際、化学合成された 3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸を標準物質（スタンダード）として用いることができる。

【0056】

すなわち、計量済みの合成 3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸と呈色試薬との発色の度合いを基準にすることで、汗に含まれる β -ヒドロキシカルボン酸をより正確に定量できる。同時に β -ヒドロキシカルボン酸の存在量はアポクリン臭の強度に比例するので、アポクリン臭の程度を正確に判定することができる。

【0057】

その際使用する 3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸の標準物質は、実験室内で相当濃度まで希釈して用いても良いが、比較に適した量を簡単に分取するため、メタノールやアセトン等の溶媒に希釈して利用した方が便利である。特に 1~100 μ g 範囲の 3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸を 100 μ L 程度の希釈液として、計り取れる程度に希釈された標準液を用いることが好ましい。

【0058】


3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸は合成可能であり、一定品質の合成品を安定供給することで、時と場所を選ばずにアポクリン臭を評価するための標準

物質として便利に利用できる。3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸は、例えば下記反応式に従って、レフォルマツキー反応 [Reformatskij Reaction; Ber. 20, 1210(1887), J. Russ. Phys. Chem. Soc., 22, 44(1890)] により β 位に水酸基を持つエステルを合成し、そのエステルを加水分解することにより合成することができる (反応式 (3))。

【0059】

【化3】

反応式 (3)



(式中、Xはハロゲン原子である。)

【0060】

また本発明においては、比較したいサンプル間の着色の差が微妙な場合、あるいは、デオドラント剤の使用後やアポクリン汗腺の除去手術の後にアポクリン臭がどの程度軽減されたのかを判定する際、分析機器を用いて試験液の色相を数値化することで、判定結果から主観性を排除することができる。

【0061】

その際使用する分析機器としては、試験液の発色の程度を測定できるものであれば特に限定されないが、2-ニトロフェニルヒドラジンを用いた呈色反応により生成せしめる酸ヒドラジドには、比色計や紫外可視分光光度計等が利用できる。また、9-アンスリルジアゾメタンを用いた呈色反応により生成せしめる9-アンスリルメチルエステルには蛍光分光光度計等が利用できる。

【0062】

さらに、本発明においては、わきが体質と言われる人の腋窩部から特異的に発生するアポクリン臭の程度だけでなく、わきが体質の有無に関わらず人の腋窩部から発生する酸臭 (汗臭とも呼ばれる) の程度も迅速且つ簡単に判定することも

できる。

【0063】

アポクリン臭と酸臭の寄与の度合いを判定する方法としては、汗から抽出した酸性物質を、アポクリン臭の原因となる β -ヒドロキシカルボン酸と、酸臭の原因となる汗中の炭素数12以下の脂肪酸とに分離後、それぞれに対して呈色試薬を加えて、発現された色を観察する方法、又は、汗から抽出した酸性物質と、前記酸性物質から分離した β -ヒドロキシカルボン酸のそれぞれに対して呈色試薬を加えて、発現された色を観察する方法が挙げられる。

【0064】

酸臭の程度を判定する方法としては、酸臭の原因となる汗中の β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸に対して呈色試薬を加えればよい。例えば、図2の如く、吸着カラムクロマトグラフィーにおいて、展開溶媒として、ジエチルエーテルを用いて、 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸を中心とする汗由来の酸性成分を溶出した後、メタノールを使って β -ヒドロキシカルボン酸を溶出させ、得られたエーテル画分とメタノール画分に対し、それぞれ呈色試薬を加えて、発現された色を観察することによって、アポクリン臭と酸臭の寄与の度合いを迅速かつ簡単に判定することができる。

【0065】

また、薄層クロマトグラフィーにおいては、薄層クロマトグラフィーのプレートに人の汗から抽出した酸性物質を滴下し、そこに呈色試薬を滴下して、酸性物質全体を発色させる。酸性物質全体により発現する色は、アポクリン臭の主要な原因成分である β -ヒドロキシカルボン酸と、酸臭の主要な原因成分である β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸の総量に対し、正の相関関係がある。

【0066】

一方、別途用意した同様の薄層クロマトプレートに、抽出した同じ酸性物質を滴下し、展開溶媒にて β -ヒドロキシカルボン酸と、それ以外の脂肪酸を分離した後、滴下スポットの中心に残った β -ヒドロキシカルボン酸に呈色試薬を滴下して発色させる。こちらのプレートで発現する色は、アポクリン臭の主要な原因

成分である β -ヒドロキシカルボン酸の量に対し、正の相関関係がある。従って、双方で発現した色を観察することで、アポクリン臭と酸臭の寄与の度合いを判定することができる。

【0067】

従って、本発明に係る体臭判定キットを用いれば、個々の被験者における、アポクリン臭と酸臭の寄与の度合いについて迅速かつ簡単に判定することが可能である。

【0068】

汗に含まれるカルボン酸と反応し、発色する呈色試薬としては、酸臭への寄与の大きい炭素数12以下の脂肪酸のカルボキシル基と反応するものであれば特に限定されないが、 β -ヒドロキシカルボン酸のカルボキシル基と反応して発色する前述の呈色試薬を利用することができる。

【0069】

体臭のタイプ及び強さ、すなわち、汗由来の酸性物質に対するアポクリン臭と酸臭それぞれの寄与の程度を正確に判定するために、呈色試薬の反応性は、 β -ヒドロキシカルボン酸及び該 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸に対する特異性が高く、それ以外の酸性物質に対する呈色反応が弱いことが望ましい。

【0070】

以上のように、本発明に係る体臭判定キットは、ガスクロマトグラフィーや液体クロマトグラフィー等の高価な分析機器を用いることなく、人の体臭又は体臭の一部である総合的な腋臭の程度を、腋窩部のアポクリン臭の有無及び強弱を中心とし、さらに酸臭の有無及び強弱を考慮して、確実に迅速かつ簡単に判定することが可能であるので、病院（皮膚科など）や保健所をはじめとする検査機関において、自己の腋臭に関心のある人に対してアポクリン臭の程度を診断する場合や、デオドラント剤やアポクリン汗腺の除去手術等の効果を判定する場合に利用することができる。

【0071】

デオドラント剤の使用やアポクリン汗腺の除去手術等の体臭を軽減する努力が

現状において功を奏しているかということを判定する場合には、例えば、デオドラント剤の使用前後における汗中の β -ヒドロキシカルボン酸及び／又は該 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸を、本体臭判定キットを用いて、定量評価し比較すれば良い。例えば、サンプルを採取した時期が異なっている場合には、最初に採取した汗サンプルが化学変化を起こさないように冷凍庫等の適当な場所に保管し同時に判定試験を実施しても良いし、汗中の β -ヒドロキシカルボン酸及び該 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸を定量評価をする際、試験液の色を分析機器により数値化しておけば、判定試験の実施時期が異なっても、正確に比較し評価することができる。

【0072】

また、本発明に係る体臭判定キットは、アポクリン臭をターゲットとするデオドラント剤の開発研究において、デオドラント剤サンプルの有効性を評価する場合やわきが体質のある人をスクリーニングする場合に利用することができる。

【0073】

アポクリン臭をターゲットとするデオドラント剤の有効性を判定する方法としては、例えば、 β -ヒドロキシカルボン酸を所定濃度で含有するサンプルに、所定量のデオドラント剤サンプルを添加し、 β -ヒドロキシカルボン酸の量、好ましくは3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸の量を本発明に係る本体臭判定キットを用いて評価することで、デオドラント剤サンプルの有効性を正確で迅速かつ簡単に判定することができる。

【0074】

また、デオドラント剤サンプルを人の腋窩部に実際に適用し、適用の前後に各々採取した腋窩部の汗に含まれる β -ヒドロキシカルボン酸、好ましくは3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸を本発明に係る体臭判定キットを用いて評価し比較することも可能である。

【0075】

以上に述べたキットの具体的な構成例としては、例えば、以下の様なものが挙げられるが、これらに限定されるわけではない。

(1) 人の汗を採取するための脱脂綿やプラスチックカップ等を、好ましくは、

そのまま使用可能な状態に加工し、必要に応じて外装で梱包したパッケージ。

(2) 上記パッケージの構成要素に、人の汗から酸性物質を抽出するためのアルカリ水溶液や有機溶剤、分液ロート等の試薬、溶媒を組み合わせたパッケージ。

(3) 上記いずれかのパッケージの構成要素に、人の汗由来 β -ヒドロキシカルボン酸と、それ以外の炭素数 12 以下の脂肪酸を分離するために用いる、吸着クロマトグラフィーのカラムや薄層クロマトグラフィーのプレート等の器具を組み合わせたパッケージ。

(4) 上記いずれかのパッケージの構成要素に、吸着又は薄層クロマトグラフィーにおいて、酸性物質から β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数 12 以下の脂肪酸を溶出するために用いられる中極性溶媒を組み合わせたパッケージ。

(5) 上記いずれかのパッケージの構成要素に、吸着クロマトグラフィーにおいて、カラムから β -ヒドロキシカルボン酸を溶出するために用いられる高極性溶媒を組み合わせたパッケージ。

(6) 上記いずれかのパッケージの構成要素に、人の汗由来 β -ヒドロキシカルボン酸と反応する呈色試薬を、好ましくは、そのまま使用可能な組成又は濃度に調製した状態で容器に充填し、必要に応じて外装で梱包したパッケージ。

(7) 上記いずれかのパッケージの構成要素に、前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数 12 以下の脂肪酸と反応する呈色試薬を、好ましくは、そのまま使用可能な組成又は濃度に調製した状態で容器に充填し、必要に応じて外装で梱包したパッケージ。

(8) 上記いずれかのパッケージの構成要素に、人の汗由来 β -ヒドロキシカルボン酸及び前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数 12 以下の脂肪酸と反応する呈色試薬を、好ましくは、そのまま使用可能な組成又は濃度に調製した状態で容器に充填し、必要に応じて外装で梱包したパッケージ。

(9) 上記いずれかのパッケージの構成要素に、汗に含まれる β -ヒドロキシカルボン酸を腋窩部の汗から単離した後、呈色試薬により定量評価する際、呈色反応前の予備調製（例えば、 β -ヒドロキシカルボン酸を誘導体化する等のため）に用いる補助試薬を組み合わせたパッケージ。

(10) 上記いずれかのパッケージの構成要素に、汗に含まれる β -ヒドロキシ

カルボン酸を腋窩部の汗から単離した後、呈色試薬により定量評価する際、試験液の呈色の度合いを確認するために使用する紫外線ランプ等の器具を組み合わせたパッケージ。

(11) 上記いずれかのパッケージの構成要素に、汗に含まれる β -ヒドロキシカルボン酸を腋窩部の汗から単離した後、呈色試薬により定量評価する際、標準物質（スタンダード）として用いる、好ましくは化学合成された 3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸または 3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸の希釈液を組み合わせたパッケージ。

(12) 上記いずれかのパッケージの構成要素に、汗に含まれる β -ヒドロキシカルボン酸を腋窩部の汗から単離した後、呈色試薬により定量評価する際、試験液の発色の程度を判断するための発色見本シートを組み合わせたパッケージ。

(13) 上記いずれかのパッケージの構成要素に、呈色試薬の一回使用量の採取及び滴下が容易な、ピペット等の滴下手段を添付したパッケージ。

(14) 上記いずれかのパッケージの構成要素に、試験液の呈色の度合いを数値化するために使用する色差計や分光光度計等の分析機器を組み合わせたパッケージ。

【0076】

【実施例】

(実施例1)

1. 腋臭の官能評価

健康な日本人男性 65 名にボランティアとして協力してもらった。7 人の専門パネラーにより、Tシャツの腋窩部に当たる部分について、アポクリン臭の強さおよび酸臭の強さを下記基準で評価した。

<官能評価基準>

強度 0 匂わない。

強度 1 わずかに匂う。

強度 2 弱く匂う。

強度 3 匂う。

強度 4 やや強く匂う。

強度5 非常に強く匂う。

【0077】

その結果、被験者のうち、アポクリン臭については、強度3以上の人が10名、強度1又は2の人が3名、強度0の人が52名であった。

【0078】

2. 被験者の選出

強度3以上のアポクリン臭が認められた人4名（被験者No. 1～4）、強度1又は2のアポクリン臭が認められた人3名（被験者No. 5～7）、アポクリン臭が認められなかった人（強度0）3名（被験者No. 8～10）を実施例1の被験者とした。

【0079】

3. 3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸の定量

Tシャツの利き腕側の腋窩部に当たる部分に綿パッドを縫い付け、このTシャツを被験者に24時間着用させた後に回収し、酸-塩基抽出法を用いて腋窩部の綿パッドから汗由来の酸性成分を抽出した。次にシリカゲルミニカラム（Varian Bond Elute Jr）、ジエチルエーテル10mL、メタノール10mLを使用して、酸性抽出物をジエチルエーテル画分とメタノール画分に分離した。メタノール画分を一度濃縮した後、1mLのメスフラスコ（DURAN製）を用いて、1mLの希釈液を調製した。

【0080】

希釈液のうちの1 μ Lを、ガスクロマトグラフィー-質量分析計（GC-MS）を用いて分析した。合成された3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸を標準物質（スタンダード）として用い、検量線を作成し、汗に含まれる3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸の量を測定した。

【0081】

腋臭の官能評価結果および3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸の定量結果を表1に示す。3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸は、アポクリン臭が認められるすべての被験者（被験者No. 1～7）のメタノール画分から検出された。一方、ジエチルエーテル画分からは、検出されなかった。

【0082】

【表1】

表 1

被験者 No.	官能評価		3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸 検出量 (ug)	
	アポクリン臭強度	酸臭強度	メノール画分	エーテル画分
1	4	4	33.93	Not Detected
2	5	5	64.29	"
3	3	3	15.71	"
4	4	4	37.50	"
5	2	2	1.71	"
6	1	2	0.87	"
7	2	2	1.39	"
8	0	1	Not Detected	"
9	0	2	"	"
10	0	1	"	"

<官能評価基準>

強度0 匂わない。

強度1 わずかに匂う。

強度2 弱く匂う。

強度3 匂う。

強度4 やや強く匂う。

強度5 非常に強く匂う。

【0083】

強度3以上のアポクリン臭が認められる群（被験者No. 1～4）では、3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸の検出量は、15.71～64.29 μg の範囲内であった。強度1又は2のアポクリン臭が認められる群（被験者No. 5～7）では、3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸の検出量は、0.87～1.71 μg の範囲内であった。一方、アポクリン臭が認められない（強度0）群（被験者No. 9～12）では、3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸は、いずれの被験者からも検出されなかった。

【0084】

(実施例 2)

実施例 1 で得られたメタノール画分 (GC-MS 分析のために $1\ \mu\text{L}$ 使用) を $0.5\ \text{mL}$ まで濃縮した後、スクリュウ栓付きの試験管 (マルエム製、NR-10) に移し取った。色相を比較するためのブランクサンプル (メタノール $0.5\ \text{mL}$ を添加) とともに、 $40\ \text{mM}$ 塩酸-塩酸エタノール ($3:1$, v/v) で調製した $20\ \text{mM}$ 2-ニトロフェニルヒドラジン溶液 $100\ \mu\text{L}$ 、 $3\ \text{v/v}\%$ ピリジンのエタノール溶液 $100\ \mu\text{L}$ および $250\ \text{mM}$ EDC (1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル) カルボジイミド) のエタノール溶液 $100\ \mu\text{L}$ を順次加えた。この混液を 60°C で 20 分間加熱した後、水-メタノール混液 ($1:4$, v/v) で調製した 15% (w/v) 水酸化カリウム液 $50\ \mu\text{L}$ を加えた。 60°C でブランクの褐色が消えるまで (15 分間) 加熱した。室温まで放冷後、肉眼で反応液の色を観察した。

【0085】

結果を表 2 に示す。ブランクサンプルは、未反応試薬由来の明るい黄色を呈すが、3-ヒドロキシ-3-メチルヘキサン酸が検出された被験者のメタノール画分は、酸ヒドラジド生成に伴う赤紫色を呈した。色相は検出量に比例して、やや茶色がかった黄色から濃い赤紫色へ変化した。

【0086】

【表 2】

表 2

被験者 No.	アポクリン臭 強度	3-ヒドロキシ-3-メチル ヘキサン酸の検出量 (ug)	呈色	試験液の色相
1	4	33.93	○	濃い赤紫色
2	5	64.29	○	非常に濃い赤紫色
3	3	15.71	○	やや濃い赤茶色
4	4	37.50	○	濃い赤紫色
5	2	1.71	○	やや茶色を帯びた黄色
6	1	0.87	○	やや茶色を帯びた黄色
7	2	1.39	○	やや茶色を帯びた黄色
8	0	Not Detected	×	明るい黄色 (ブランクと同等)
9	0	"	×	
10	0	"	×	

<評価基準>

- 色相の変化が十分に認められる。
- △ 色相の変化が認められる。
- × ブランクと同等で、変化が認められない。

【0087】

強度3以上のアポクリン臭が認められる群では、反応液の色は赤から赤紫色の範囲であった。強度1又は2のアポクリン臭が認められる群では、反応液の色はやや茶色がかった黄色であった。一方、アポクリン臭が全く認められない群（強度0）では、いずれの被験者の試験液も着色せず、ブランクサンプルと同等の色相であった。

【0088】

次に、色彩色差計を用いて試験液の色相を数値化した。縦軸に色差（ ΔE^*a b）、横軸に実施例1でのアポクリン臭の官能評価結果をとり、グラフ化した。結果は図4に示す如く、色差（ ΔE^*a b）は、アポクリン臭の強度に比例して増加した。

【0089】

<色差計による測定条件>

使用機器：ミノルタ色彩色差計CT-310

セル光路長：2 mm

温度：23℃

ブランク試料の測定データを色差基準色 (L^*_t 、 a^*_t 、 b^*_t)、測定データを (L^* 、 a^* 、 b^*) として、下式により色差を求めた。

【0090】

【数1】

$$\Delta E^*_{ab} = \sqrt{((\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2)}$$

$$\text{ここで } \Delta L^* = L^* - L^*_t$$

$$\Delta a^* = a^* - a^*_t$$

$$\Delta b^* = b^* - b^*_t$$

【0091】

(実施例3)

実施例1で得られたジエチルエーテル画分のうち、1 mL をスクリュウ栓付きの試験管 (マルエム製、NR-10) に移し取った。45℃の水浴上で溶媒を留去し、メタノール0.5 mL を加えた後、色相を比較するためのブランクサンプル (メタノール0.5 mL を添加) とともに、実施例2と同様の手順で、発色試薬を使って呈色させた。実施例2で得られたメタノール画分とともに、可視-紫外分析計を用いて色相を数値化した。縦軸にメタノール画分の吸光度、横軸にエーテル画分の吸光度を取り、個々の被験者における、アポクリン臭と酸臭の寄与の度合いについて評価した。

【0092】

結果は図5に示すが如く、酸性抽出物のメタノール画分の呈色が強い人、すなわち、アポクリン臭が認められる人は、ジエチルエーテル画分の呈色 (吸収) も強い傾向があった。一方、アポクリン臭が認められない人、すなわち、メタノール画分が呈色しない人は、ジエチルエーテル画分の呈色 (吸収) も弱い傾向があった。

【0093】

<紫外-可視分光計による測定条件>

使用機器：BECHMAN DU-600

セル光路長：10mm

温度：23℃

データ測定方法：530nmにおける、サンプルの吸収スペクトルからブランク試料の吸収スペクトルを差し引いたスペクトルのピーク面積を測定した。

【0094】

(実施例4)

実施例1の被験者10名を実施例4の被験者とした。実施例1と同様の方法で分離した汗の酸性抽出物のメタノール画分を0.5mlまで濃縮した後、試験管に移した。色相を比較するためのブランクサンプル（メタノール0.5mLを添加）とともに、9-アンスリルジアゾメタンの1.0%アセトン溶液25μLを加え、密栓をして、約1時間室温で放置した。その後、紫外線ランプ（ウルトラバイオレット社製／長波長365nm型）を用いて、発生する蛍光を肉眼で観察した。結果は表3に示す。

【0095】

【表3】

表3

被験者 No.	アポクリン臭 強度	呈色	試験液の蛍光
1	4	○	非常に強い
2	5	○	非常に強い
3	3	○	やや強い
4	4	○	非常に強い
5	2	○	強い
6	1	○	強い
7	2	○	強い
8	0	×	弱い (ブランクと同等)
9	0	×	
10	0	×	

【0096】

表3において、実施例1でアポクリン臭が認められた被験者のサンプルは、アポクリン臭の強度に比例してより強い蛍光を発する結果を示した。これに対してブ

ランクサンプルからは強い傾向が観察されなかった。

【0097】

【発明の効果】

本発明の体臭判定キットは、アポクリン臭のある人の汗に特異的に存在する β -ヒドロキシカルボン酸及び／又は酸臭の原因物質である該 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数12以下の脂肪酸又はその誘導体又はその分解物の呈色反応を利用し、人の体臭又は体臭の一部である腋臭の程度を、腋窩部のアポクリン臭の有無及び強弱を中心とし、さらに酸臭の有無及び強弱を考慮して、確実に迅速かつ簡単に判定することができる。

また、本発明の体臭判定キット及び判定方法は、呈色反応により発現された色相を、色差計等の分析機器を用い数値で表現することで、判定結果から主観性を排除することが可能である。

【0098】

さらに、本発明の体臭判定キット及び判定方法は、病院、保健所、研究所等において、自己の腋臭に関心のある人に対してアポクリン臭の程度を診断する場合、アポクリン汗腺の除去手術等の効果を判定する場合、アポクリン臭をターゲットとするデオドラント剤サンプルの有効性を評価する場合等に、正確で迅速且つ簡単な体臭判定キット及び判定方法として利用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 体臭の程度を判定する手順を示した図である。

【図2】 吸着カラムクロマトグラフィー法を利用して体臭の程度を判定する際の判定キットの使用法を示した図である。

【図3】 薄層クロマトグラフィー法を利用して体臭の程度を判定する際の判定キットの使用法を示した図である。

【図4】 アポクリン臭強度（官能評価）と呈色反応後の試験液の色差との関係を示した図である。

【図5】 呈色反応後のメタノール画分とエーテル画分の吸光度を示した図である。

【書類名】

図面

【図 1】




図1 呈色反応を利用した体臭の迅速かつ簡便な検査方法

【図 2】






図2 体臭簡易判定キットの使用例(1)

【図 3】



<陽性の場合>



<陰性の場合>




図3 体臭簡易判定キットの使用例(2)

【図 4】




図4 アポクリン臭強度と色差の関係

【図 5】




図5 メタノール画分とエーテル画分の吸光度

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 体臭のタイプ及びニオイの程度を確実に迅速かつ簡単に判定することが可能な体臭判定キット、及びそれを用いて体臭を判定する方法を提供する。

【解決手段】 人の汗由来 β -ヒドロキシカルボン酸及び／又は前記 β -ヒドロキシカルボン酸以外の炭素数 12 以下の脂肪酸と反応する呈色試薬を含む人の体臭判定キット。

【選択図】 図 1

特願 2003-083801

出願人履歴情報

識別番号

[000000918]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

氏 名

花王株式会社